

クリニカルパスウェイ 顎骨嚢胞(腫瘍)摘出術を受ける患者さんへ

平成28年4月作成
東京慈恵医科大学附属第三病院

患者番号 @PATIENTID 患者氏名 @PATIENTNAME

	外来	入院日	手術日		術後1日目	術後2～6日目	退院日
日時	月 日	月 日	月 日		月 日	/ ~ /	月 日 午前中
目標	手術の必要性和内容が理解できる。	手術の内容・目的を理解することができる。	<術前> 不安を最小限に手術を受けることができる。	<術後> 痛みがコントロールでき、安楽に過ごせる。出血や感染が予防できる。	痛みを我慢せずコントロールができる。出血や感染が予防できる。	痛みを我慢せずコントロールができる。出血や感染が予防できる。	退院後の注意点を考慮して日常生活を送れる。
食事	制限はありません	20時より経口補水液(または水)を飲みます。その他の水分は飲まないでください。	食事はできません。朝6時まで経口補水(または水)を飲みます。飲んだ量を看護師が確認します。	医師の指示があるまでは食事・飲水はできません。 	・五分粥、きざみ食になります 経口摂取が困難な場合は鼻から管を入れて栄養管理をします。	・五分粥、きざみ食 →徐々に常食へ変わります	
活動	制限はありません		→		医師の指示があるまではベッド上安静になります。	制限はありません	→
検査 処置	・採血 ・採尿 ・心電図 ・肺機能 ・レントゲン 術前処置が必要な時は他の診療科を受診します。	・外来にて口腔内清掃、歯石除去(午後)します。 ・麻酔科医の診察があります。	・手術前に排泄をすませ、貴金属類を外して手術着・パンツ・靴下に着替えてください。 ・盗難防止のため貴重品は御家族に渡すか金庫に保管してください。	手術後は酸素マスク、点滴をします。場合によっては、尿道カテーテルと手術した部位に管が入っています。	・採血・採尿・レントゲン ・外来で毎日処置を行います 	→	→
薬	・通常通り内服してください。サプリメント等は2週間前から内服中止となります。担当医にお知らせください。 ・ワクチンは1か月前までに済ませてください。	・入院時、現在服用中の薬は一週間分お持ちください ・持参された内服薬の確認を行います	医師の指示があるお薬のみ、内服します。 	抗生剤の点滴をします。 	抗生剤の点滴を1日2回行います。	→	内服治療を継続してください。
清潔	入浴できます	入浴できます	入浴はできません	入浴はできません	医師の許可によりシャワー浴ができます。 		
指導 説明	・手術オリエンテーション ・術後の生活・合併症の説明 ・手術同意書 ・輸血同意書 ・服薬指導	・転倒予防のため、かかとのある履きなれた靴をお持ちください。 ・手術と入院中の流れを看護師が説明します。 ・指輪・マニキュア・ジェルネイルは外してください。		気分が悪くなったり痛みがあるときは教えてください。	医師の指示により歯みがき・うがいができます。		次回診療予約票をお渡しします。 【退院後の注意点】 □退院後に38℃以上の発熱・痛み・出血などの症状がありましたら外来または救急室に電話をして受診の相談をしてください。 □刺激物やアルコールの摂取はさけてください。 □喫煙している方は退院後も禁煙してください。