

申請科	レジメン番号	レジメン名	休業期間 (日)	総コース数	使用薬剤	投与経路	用量	投与時間 間隔	投与日	備考
腫瘍・血液内科	56-01-057	JALSG ALL97維持療法			ピンクリスチン メトレキサート メルカプトプリン ブレドニゾロン	静注 内服 内服 内服	1.3 mg /m2 20 mg /m2 60 mg /m2 60 mg /m2		d1 週1回 連日 d1-4	4週毎 就寝前もしくは朝食後 就寝前もしくは朝夕食後 4週毎
腫瘍・血液内科	56-01-090	高齢者用 CLL用 フルダラビン-シクロホスファミド	28		フルダラビン シクロホスファミド	静注 内服	20 mg /b 50 mg /b	1hr	d1-3 d1-3	
腫瘍・血液内科	56-01-091	FC療法	28	制限なし	フルダラビン シクロホスファミド	点滴静注 点滴静注	20 mg /m2 250 mg /m2	1hr 1hr	d1-3 d1-3	
腫瘍・血液内科	56-01-100	JALSG Ph+ALL208維持療法	28	寛解到達後2年まで継続	ピンクリスチン ブレドニゾロン イマチニブ	点滴静注 内服 内服	1.3 mg /m2 60 mg /m2 600 mg /b	30min	d1 d1-5 d1-28	
腫瘍・血液内科	56-01-117	JALSG ALL202-O 維持療法		寛解導入療法開始後2年間継続	ピンクリスチン ブレドニゾロン メトレキサート メルカプトプリン	点滴静注 内服 内服 内服	1.3 mg /m2 60 mg /m2 20 mg /m2 60 mg /m2	10min 分1(寝る前)	d1 d1-5 d1,8,15,22 d1-28	
腫瘍・血液内科	56-01-124	Nelarabine	21		ネララビン	点滴静注	1500 mg /m2	2hr	d1,3,5	1500mg/m2は成人量
腫瘍・血液内科	56-01-125	ベスボンサ	28	HSCT予定あり:3コース,HSCT予定なし:6コース	イノズマブオゾガマイシン イノズマブオゾガマイシン イノズマブオゾガマイシン	点滴静注 点滴静注 点滴静注	0.8 mg /m2 0.5 mg /m2 0.5 mg /m2	1hr 1hr 1hr	d1 d8,15 d1,8,15	1コース目は原則q3w CRが得られた場合は28日間まで延長可能 CRが得られた場合の次のコース以降
腫瘍・血液内科	56-01-138	AZA+Venetoclax	28	PDまで	ベネトクラクス ベネトクラクス ベネトクラクス ベネトクラクス アザシチジン	内服 内服 内服 内服 皮下注	100 mg /b 200 mg /b 400 mg /b 400 mg /b 75 mg /m2	分1(食後) 分1(食後) 分1(食後) 分1(食後)	d1(1コース目) d2(1コース目) d3-28(1コース目) d1-28(2コース目以降)	CYP3A4阻害薬併用で減量 CYP3A4阻害薬併用で減量 CYP3A4阻害薬併用で減量 CYP3A4阻害薬併用で減量 点滴(10min)も可
腫瘍・血液内科	56-01-145	Ara-C+Venetoclax	28	PDまで	ベネトクラクス ベネトクラクス ベネトクラクス ベネトクラクス ベネトクラクス シタラビン	内服 内服 内服 内服 内服 皮下注	100 mg /b 200 mg /b 400 mg /b 600 mg /b 600 mg /b 20 mg /m2	分1 分1 分1 分1 分1	d1(1コース目) d2(1コース目) d3(1コース目) d4-28(1コース目) d1-28(2コース目以降)	
腫瘍・血液内科	56-01-146	AO療法(2コース目)	28	1コース(3コース目以降は別レジメン)	アカラブルチニブ オビヌツズマブ オビヌツズマブ オビヌツズマブ	内服 点滴静注 点滴静注 点滴静注	200 mg /b 100 mg /b 900 mg /b 1000 mg /b	分2	d1-28 d1 d2 d8,15	
腫瘍・血液内科	56-01-147	AO療法(3-7コース目)	28	5コース(8コース目以降はPDまでアカラブルチニブ単剤で継続可)	アカラブルチニブ オビヌツズマブ	内服 点滴静注	200 mg /b 1000 mg /b	分2	d1-28 d1	