

申請科	レジメン番号	レジメン名	休業期間(日)	総コース数	使用薬剤	投与経路	用量	投与時間 間隔	投与日	備考
産婦人科	22-00-013	NED/CPT11	28	5から6コース	イリノテカン ネダプラチン	点滴静注 点滴静注	50 mg /m2 80 mg /m2	1hr 2hr	d1,8,15 d1	
産婦人科	22-00-026	MTX(筋注)	7	1から2コース	メトレキサート	筋注	50 mg /m2		d1	
産婦人科	22-00-049	ドキシル単剤療法	28	DXRの総投与量が500mg/m ² まで	リボソーマルドキソルピジン	点滴静注	50 mg /m2	2hr	d1	ドキシソルピジン500mg/m ² まで
産婦人科	22-00-050	ドキシル+カルボプラチン併用療法	28	DXRの総投与量が500mg/m ² まで	リボソーマルドキソルピジン カルボプラチン	点滴静注 点滴静注	30 mg /m2 5 (AUC)	1hr 1hr	d1 d1	ドキシソルピジン500mg/m ² まで
産婦人科	22-00-067	ジェムザール単剤療法	28	6コース	ゲムシタピン	点滴静注	1000 mg /m2	30min	d1,8,15	可能な限り継続
産婦人科	22-00-068	ドセタキセル+ジェムザール併用療法	21	6コース	ドセタキセル ゲムシタピン	点滴静注 点滴静注	70 mg /m2 800 mg /m2	1hr 30min	d1 d1,8	
産婦人科	22-00-072	パクリタキセル+パラプラチン併用療法	21	6から12コース	パクリタキセル カルボプラチン	点滴静注 点滴静注	180 mg /m2 6 (AUC)	3hr 1hr	d1 d1	
産婦人科	22-00-073	パクリタキセル+パラプラチン併用療法(パクリタキセル週1回投与)	21	6から12コース	パクリタキセル カルボプラチン	点滴静注 点滴静注	80 mg /m2 6 (AUC)	1hr 1hr	d1,8,15 d1	
産婦人科	22-00-074	パクリタキセル+パラプラチン併用療法(3分割)	21	6から12コース	パクリタキセル カルボプラチン	点滴静注 点滴静注	60 mg /m2 2 (AUC)	1hr 1hr	d1,8,15 d1,8,15	
産婦人科	22-00-075	パクリタキセルconsoli療法	28	12コース	パクリタキセル	点滴静注	180 mg /m2	3hr	d1	
産婦人科	22-00-093	プリプラチン+放射線併用療法	7	6コース	シスプラチン	点滴静注	40 mg /m2	2hr	d1	
産婦人科	22-00-097	ドセタキセル(70)+パラプラチン併用療法	21	6コース	ドセタキセル カルボプラチン	点滴静注 点滴静注	70 mg /m2 6 (AUC)	1hr 1hr	d1 d1	
産婦人科	22-00-104	ノギテカン(ハイカムチン)	21	6コース	ハイカムチン	点滴静注	1.5 mg /m2	30min	d1-5	
産婦人科	22-00-107	カンプト単剤療法	28	6コース	イリノテカン	点滴静注	150 mg /m2	90min	d1,d15	
産婦人科	22-00-110	MTX療法(絨毛)	14	hCGの結果に応じて	メトレキサート	筋注	20 mg /b		d1-5	点滴(30min)も可
産婦人科	22-00-111	ドセタキセル単剤	21		ドセタキセル	点滴静注	70 mg /m2	1hr	d1	
産婦人科	22-00-113	TC(dosedenseTC)+アバステン	21	6コース(Bevは規定なし)	パクリタキセル カルボプラチン ペバシズマブ	点滴静注 点滴静注 点滴静注	80 mg /m2 6 (AUC) 15 mg /kg	1hr 1hr ※	d1,d8,d15 d1 d1	※①90min②60min③30min
産婦人科	22-00-114	TC(tri-weekly)+アバステン	21	6コース(Bevは規定なし)	パクリタキセル カルボプラチン ペバシズマブ	点滴静注 点滴静注 点滴静注	180 mg /m2 6 (AUC) 15 mg /kg	3hr 1hr ※	d1 d1 d1	※①90min②60min③30min
産婦人科	22-00-121	DC+アバステン	21	6コース(Bevは規定なし)	ドセタキセル カルボプラチン ペバシズマブ	点滴静注 点滴静注 点滴静注	70 mg /m2 6 (AUC) 15 mg /kg	1hr 1hr ※	d1 d1 d1	※①90min②60min③30min
産婦人科	22-00-133	Act-D単剤	14	hCGが陰性化するまで	アクチノマイシンD	点滴静注	0.01 mg /kg	30min	d1-5	
産婦人科	22-00-134	TC+Bev(頸癌)	21	6コース(最大9コース,Bevは規定なし)	パクリタキセル カルボプラチン ペバシズマブ	点滴静注 点滴静注 点滴静注	175 mg /m2 5 (AUC) 15 mg /kg	3hr 1hr ※	d1 d1 d1	※①90min②60min③30min
産婦人科	22-00-144	Eribulin(ハラヴェン)	21	PDまで	エリブリン	点滴静注	1.4 mg /m2	全開	d1,d8	
産婦人科	22-00-147	ドキシソルピジン単剤療法	21	6コース	ドキシソルピジン	点滴静注	75 mg /m2	30min	d1	
産婦人科	22-00-149	GEM+Bev(3週)	21	PDまで	ゲムシタピン ペバシズマブ	点滴静注 点滴静注	1000 mg /m2 15 mg /kg	30min ※	d1,d8 d1	※①90min②60min③30min
産婦人科	22-00-150	ドキシル+アバステン療法(Bev2週毎投与)	28	6コース(Bevは規定なし)	リボソーマルドキソルピジン ペバシズマブ	点滴静注 点滴静注	40 mg /m2 10 mg /kg	2hr ※	d1 d1,d15	※①90min②60min③30min
産婦人科	22-00-153	Etoposide+CDDP療法(EP療法)	21	5コース	エトポシド シスプラチン	点滴静注 点滴静注	100 mg /m2 60 mg /m2	90min 2hr	d1-3 d1	
産婦人科	22-00-154	TC療法(頸癌)	21	6コース	パクリタキセル カルボプラチン	点滴静注 点滴静注	175 mg /m2 5 (AUC)	3hr 1hr	d1 d1	
産婦人科	22-00-163	TP療法(卵巣癌)	21	6コース	パクリタキセル シスプラチン	点滴静注 点滴静注	180 mg /m2 75 mg /m2	3hr 2hr	d1 d1	
産婦人科	22-00-170	ペムプロリズマブ	21		ペムプロリズマブ	点滴静注	200 mg /b	30min	d1	
産婦人科	22-00-176	ペムプロリズマブ(6週間間隔)	42		ペムプロリズマブ	点滴静注	400 mg /b	30min	d1	
産婦人科	22-00-177	Bev+Olaparib(維持)	21	Bev:最長15ヶ月間、olapa:24ヶ月まで	ペバシズマブ オラパリブ	点滴静注 内服	15 mg /kg 600 mg /b	※ 分2	d1 d1-21	※①90min②60min③30min
産婦人科	22-00-178	GBDCA/GEM	21	6コース(MAX10コース)	カルボプラチン ゲムシタピン	点滴静注 点滴静注	4 (AUC) 1000 mg /m2	1hr 30min	d1 d1,d8	
産婦人科	22-00-179	GBDCA/GEM+Bev	21	6コース(MAX10コース、Bevは規定なし)	カルボプラチン ゲムシタピン ペバシズマブ	点滴静注 点滴静注 点滴静注	4 (AUC) 1000 mg /m2 15 mg /kg	1hr 30min ※	d1 d1,d8 d1	※①90min②60min③30min
産婦人科	22-00-180	CCRT[SH法]	7	5から6コース	シスプラチン	点滴静注	40 mg /m2	2hr	d1	

申請科	レジメン番号	レジメン名	休業期間 (日)	総コース数	使用薬剤	投与経路	用量	投与時間 間隔	投与日	備考
産婦人科	22-00-182	CBDCA/PLD+Bev	28	6コース	カルボプラチン リボソーマルドキソルピジン ペバシズマブ	点滴静注 点滴静注 点滴静注	5 (AUC) 30 mg /m2 10 mg /kg	1hr 90min ※	d1 d1 d1, d15	1-6コース, ※①90min②60min③30min 7コース目以降(q3w), ※①90min②60min③30min
産婦人科	22-00-183	NDP/PTX	28	5から6コース	ネダプラチン パクリタキセル	点滴静注 点滴静注	80 mg /m2 175 mg /m2	1hr 3hr	d1 d1	
産婦人科	22-00-185	Lenvatinib+Pem(q3w)	21		ペムブロリズマブ レンパチニブ	点滴静注 内服	200 mg /b 20 mg /b	30min 分1	d1 d1-21	
産婦人科	22-00-186	Lenvatinib+Pem(q6w)	42		ペムブロリズマブ レ	点滴静注 内服	400 mg /b 20 mg /b	30min 分1	d1 d1-42	
産婦人科	22-00-190	Pembrolizumab(TMB-High, q3w)	21		ペムブロリズマブ	点滴静注	200 mg /b	30min	d1	
産婦人科	22-00-191	Pembrolizumab(TMB-High, q6w)	42		ペムブロリズマブ	点滴静注	400 mg /b	30min	d1	
産婦人科	22-00-194	TC+Pem	21	6コース(Pembroは35コース)	パクリタキセル カルボプラチン ペムブロリズマブ	点滴静注 点滴静注 点滴静注	175 mg /m2 5 (AUC) 200 mg /b	3hr 1hr 30min	d1 d1 d1	
産婦人科	22-00-195	TC+Bev+Pem	21	6コース(Bevは規定なし、Pembroは35コース)	パクリタキセル カルボプラチン ペバシズマブ ペムブロリズマブ	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注	175 mg /m2 5 (AUC) 15 mg /kg 200 mg /b	3hr 1hr ※ 30min	d1 d1 d1 d1	※①90min②60min③30min
産婦人科	22-00-196	Cepmipimab	21	上限なし	センプリマブ	点滴静注	350 mg /b	30min	d1	

申請科	レジメン番号	レジメン名	休業期間 (日)	総コース数	使用薬剤	投与経路	用量	投与時間 間隔	投与日	備考
-----	--------	-------	-------------	-------	------	------	----	------------	-----	----