

周期的に休薬が必要な薬剤一覧

薬品名	休薬期間	分類	成分名
アスピリン錠	7日間	抗血小板作用薬	アスピリン
アスピリン腸溶錠	7日間	抗血小板作用薬	アスピリン
アスピリン原末	7日間	抗血小板作用薬	アスピリン
アスファネト配合錠A81	7日間	抗血小板作用薬	アスピリン
アテロバンカプセル	7-10日間	抗血小板作用薬	EPA
アボノール錠	2日間	抗血小板作用薬	イフェンプロジル誘体塩
アンギナール錠/散	1-2日間	抗血小板作用薬	ジビリダモール
アンジュ21錠	手術前4週間、手術後2週間、産後4週間	低用量ビル(経口避妊剤)	レボルメグストレル・エチニルエストラジオール
アンジュ28錠	手術前4週間、手術後2週間、産後4週間	低用量ビル(経口避妊剤)	レボルメグストレル・エチニルエストラジオール
アンブラク細粒	24時間	抗血小板作用薬	サルボグレラト塩酸塩
アンブラク錠	24時間	抗血小板作用薬	サルボグレラト塩酸塩
イグザレルト錠	24時間	抗凝固薬	リバーロキサケン
イコペンチンエステルカプセル/粒状カプセル	7-10日間	抗血小板作用薬	EPA
イスキア配合錠A300	7日間	抗血小板作用薬	アスピリン
イニシリン配合錠	手術当日ならびに手術日前後2日間(計5日間)	経口血糖降下薬(ビグアナイド剤)	アログワチン・メトホルミン塩酸塩
イフェンプロジル誘体塩錠/細粒	2日間	抗血小板作用薬	イフェンプロジル誘体塩
ウェルナリ配合錠	手術前4週間、手術後2週間、産後4週間(閉経後骨粗鬆症治療剤)	エストロゲン・プロゲステロン	エストロゲン・プロゲステロン
エタメット配合錠HD	手術当日ならびに手術日前後2日間(計5日間)	経口血糖降下薬(ビグアナイド剤)	ピオグリタゾン・メトホルミン塩酸塩
エタメット配合錠LD	手術当日ならびに手術日前後2日間(計5日間)	経口血糖降下薬(ビグアナイド剤)	ピオグリタゾン・メトホルミン塩酸塩
エハキアソフトカプセル	7-10日間	抗血小板作用薬	EPA
エパデルS	7-10日間	抗血小板作用薬	EPA
エパデルカプセル	7-10日間	抗血小板作用薬	EPA
エバラカプセル/粒状カプセル	7-10日間	抗血小板作用薬	EPA
エパロカスカプセル/粒状カプセル	7-10日間	抗血小板作用薬	EPA
エフエント錠	14日間	抗血小板作用薬	フラスグレル塩酸塩
エメラルカプセル	7-10日間	抗血小板作用薬	EPA
エリキース錠	24時間	抗凝固薬	フィキサヘン
オソ777-21錠	手術前4週間、手術後2週間、産後4週間	低用量ビル(経口避妊剤)	ルネスタステロン・エチニルエストラジオール
オソ777-21錠	手術前4週間、手術後2週間、産後4週間	低用量ビル(経口避妊剤)	ルネスタステロン・エチニルエストラジオール
オザグレル錠	当日	抗血小板作用薬	オザグレル塩酸塩
オハルモン錠	24時間	抗血小板作用薬	リマプロスト アルファデクス
オカルノール錠	2日間	抗血小板作用薬	トラジビル
グリコラン錠	手術当日ならびに手術日前後2日間(計5日間)	経口血糖降下薬(ビグアナイド剤)	メトホルミン塩酸塩
クロピドグレル硫酸塩錠	14日間	抗血小板作用薬	クロピドグレル硫酸塩
ケアロトL-A錠	1-2日間	抗血小板作用薬	ペラプロスタナトリウム
ケタスカプセル	3日間	抗血小板作用薬	イブジラスト
コーリズム錠	2-4日間	抗血小板作用薬	シロスタゾール
コリアンコート錠	2日間	抗血小板作用薬	シラゼブ塩酸塩
コンラビン配合錠	14日間	抗血小板作用薬	クロピドグレル硫酸塩・アスピリン
サルボグレラト塩酸塩錠	24時間	抗血小板作用薬	サルボグレラト塩酸塩
シスニコカプセル	7-10日間	抗血小板作用薬	EPA
ジビリダモール散	1-2日間	抗血小板作用薬	ジビリダモール
ジビリダモール錠	1-2日間	抗血小板作用薬	ジビリダモール
ジハトス錠	手術当日ならびに手術日後2日間(計5日間)	経口血糖降下薬(ビグアナイド剤)	メトホルミン塩酸塩
ジハトス腸溶錠	手術当日ならびに手術日前後2日間(計5日間)	経口血糖降下薬(ビグアナイド剤)	メトホルミン塩酸塩
シラゼブ硫酸塩錠	2日間	抗血小板作用薬	シラゼブ塩酸塩
シルベンダー錠	10-14日間	抗血小板作用薬	チクロピジン塩酸塩
シロスタゾール錠	2-4日間	抗血小板作用薬	シロスタゾール

薬品名	休薬期間	分類	成分名
シロスタゾール0D錠	2-4日間	抗血小板作用薬	シロスタゾール
シロスタゾール錠	2-4日間	抗血小板作用薬	シロスタゾール
シロスタゾール内服ゼリー	2-4日間	抗血小板作用薬	シロスタゾール
シムアースT28錠	手術前4週間、手術後2週間、産後4週間	低用量ビル(経口避妊剤)	ルネスタステロン・エチニルエストラジオール
セクロラル細粒	2日間	抗血小板作用薬	イフェンプロジル誘体塩
ゼンアスピリン錠	7日間	抗血小板作用薬	アスピリン
ソフィアA配合錠	手術前4週間、手術後2週間、産後4週間	閉経・黄体ホルモン配合剤(中用量ビル)	ルネスタステロン・メストラノール
ソフィアC配合錠	手術前4週間、手術後2週間、産後4週間	閉経・黄体ホルモン配合剤(高用量ビル)	ルネスタステロン・メストラノール
ソルミラン顆粒状カプセル	7-10日間	抗血小板作用薬	EPA
タケルゲル配合錠	7日間	抗血小板作用薬	アスピリン・ランソプラゾール
チクロピジン硫酸塩錠/細粒	10-14日間	抗血小板作用薬	チクロピジン塩酸塩
トメナ錠	当日	抗血小板作用薬	オザグレル塩酸塩
トリアジール錠	2日間	抗血小板作用薬	トラジビル
トリキアラ錠21	手術前4週間、手術後2週間、産後4週間	低用量ビル(経口避妊剤)	レボルメグストレル・エチニルエストラジオール
トリキアラ錠28	手術前4週間、手術後2週間、産後4週間	低用量ビル(経口避妊剤)	レボルメグストレル・エチニルエストラジオール
トルケール錠	2日間	抗血小板作用薬	シラゼブ塩酸塩
トルナー錠	1-2日間	抗血小板作用薬	ペラプロスタナトリウム
ナサチムカプセル	7-10日間	抗血小板作用薬	EPA
ニニステート錠/細粒	10-14日間	抗血小板作用薬	チクロピジン塩酸塩
ニギス配合錠A81	7日間	抗血小板作用薬	アスピリン
ネルビス錠	手術当日ならびに手術日前後2日間(計5日間)	経口血糖降下薬(ビグアナイド剤)	メトホルミン塩酸塩
バイアスピリン錠	7日間	抗血小板作用薬	アスピリン
バスタレルF錠/細粒	2日間	虚血性心疾患治療薬(抗血小板作用)	トメタジジン塩酸塩
ハッサン配合錠A81	7日間	抗血小板作用薬	アスピリン
ハナシリン細粒	10-14日間	抗血小板作用薬	チクロピジン塩酸塩
ハナシリン錠	10-14日間	抗血小板作用薬	チクロピジン塩酸塩
ハフアリン配合錠A330	7日間	抗血小板作用薬	アスピリン
ハフアリン配合錠A81	7日間	抗血小板作用薬	アスピリン
ビトスカプセル	3日間	抗血小板作用薬	イブジラスト
ファホワール錠21	手術前4週間、手術後2週間、産後4週間	低用量ビル(経口避妊剤)	デソグエストレル・エチニルエストラジオール
ファホワール錠28	手術前4週間、手術後2週間、産後4週間	低用量ビル(経口避妊剤)	デソグエストレル・エチニルエストラジオール
ファミマー配合錠A81	7日間	抗血小板作用薬	アスピリン
ラザキサカプセル	{e-GFR 36以上} 24時間 {e-GFR 21.6~36} 48時間	抗凝固薬	ダビガトランエキチレートメタンソール酸塩製剤
ラノバル配合錠	手術前4週間、手術後2週間、産後4週間	閉経・黄体ホルモン配合剤(中用量ビル)	ルネスタステロン・エチニルエストラジオール
ラブリックス錠	14日間	抗血小板作用薬	クロピドグレル硫酸塩
アリウエル配合錠LD	手術前4週間、手術後2週間、産後4週間	閉経・黄体ホルモン配合剤(月経困難症治療剤)	ルネスタステロン・エチニルエストラジオール
アリリタ錠	5日間	抗血小板作用薬	チカグレロール
プレタル0D錠	2-4日間	抗血小板作用薬	シロスタゾール
プレタル散	2-4日間	抗血小板作用薬	シロスタゾール
プレトール錠	2-4日間	抗血小板作用薬	シロスタゾール
プロザイリン錠	1-2日間	抗血小板作用薬	ペラプロスタナトリウム
プロスタリン錠	1-2日間	抗血小板作用薬	ペラプロスタナトリウム
プロルナー錠	1-2日間	抗血小板作用薬	ペラプロスタナトリウム
プロレナル錠	24時間	抗血小板作用薬	リマプロスト アルファデクス
ヘガ錠	当日	抗血小板作用薬	オザグレル塩酸塩
ヘラサリA錠	1-2日間	抗血小板作用薬	ペラプロスタナトリウム

薬品名	休薬期間	分類	成分名
ペラストリン錠	1-2日間	抗血小板作用薬	ペラプロスタナトリウム
ペラプロスタナトリウム錠	1-2日間	抗血小板作用薬	ペラプロスタナトリウム
ペラプロスタNa錠	1-2日間	抗血小板作用薬	ペラプロスタナトリウム
ヘルサンチン錠	1-2日間	抗血小板作用薬	ジビリダモール
ヘルサンチンカプセル	1-2日間	抗血小板作用薬	ジビリダモール
ヘルナル錠	1-2日間	抗血小板作用薬	ペラプロスタナトリウム
ヘルミルチン錠	1-2日間	抗血小板作用薬	ジビリダモール
ホルタゾール錠	2-4日間	抗血小板作用薬	シロスタゾール
マイトシン錠	10-14日間	抗血小板作用薬	チクロピジン塩酸塩
マーヘロン21	手術前4週間、手術後2週間、産後4週間	低用量ビル(経口避妊剤)	デソグエストレル・エチニルエストラジオール
マーヘロン28	手術前4週間、手術後2週間、産後4週間	低用量ビル(経口避妊剤)	デソグエストレル・エチニルエストラジオール
メタロ配合錠LD	手術当日ならびに手術日前後2日間(計5日間)	経口血糖降下薬(ビグアナイド剤)	ピオグリタゾン塩酸塩・メトホルミン塩酸塩
メタロ配合錠HD	手術当日ならびに手術日前後2日間(計5日間)	経口血糖降下薬(ビグアナイド剤)	ピオグリタゾン塩酸塩・メトホルミン塩酸塩
メデット錠	手術当日ならびに手術日前後2日間(計5日間)	経口血糖降下薬(ビグアナイド剤)	メトホルミン塩酸塩
メトグルコ錠	手術当日ならびに手術日前後2日間(計5日間)	経口血糖降下薬(ビグアナイド剤)	メトホルミン塩酸塩
メトホルミン硫酸塩錠	手術当日ならびに手術日前後2日間(計5日間)	経口血糖降下薬(ビグアナイド剤)	メトホルミン塩酸塩
メルアラールカプセル/粒状カプセル	7-10日間	抗血小板作用薬	EPA
キース配合錠	手術前4週間、手術後2週間、産後4週間	閉経・黄体ホルモン配合剤(月経困難症治療剤)	ドロスピレノン・エチニルエストラジオール
キースフレックス配合錠	手術前4週間、手術後2週間、産後4週間	閉経・黄体ホルモン配合剤(月経困難症治療剤)	ドロスピレノン・エチニルエストラジオール
ウリダモール錠	1-2日間	抗血小板作用薬	ジビリダモール
ラベルフィーユ21錠	手術前4週間、手術後2週間、産後4週間	低用量ビル(経口避妊剤)	レボルメグストレル・エチニルエストラジオール
ラベルフィーユ28錠	手術前4週間、手術後2週間、産後4週間	低用量ビル(経口避妊剤)	レボルメグストレル・エチニルエストラジオール
リクシアナ錠	24時間	抗凝固薬	エキサパネン酸塩水和物
リマプロストアルファデクス錠	24時間	抗血小板作用薬	リマプロスト アルファデクス
ルテンヨ配合錠	手術前4週間、手術後2週間、産後4週間	閉経・黄体ホルモン配合剤(中用量ビル)	ルネスタステロン・エチニルエストラジオール
ルナルバ配合錠LD	手術前4週間、手術後2週間、産後4週間	閉経・黄体ホルモン配合剤(月経困難症治療剤)	ルネスタステロン・エチニルエストラジオール
ルナルバ配合錠ULD	手術前4週間、手術後2週間、産後4週間	閉経・黄体ホルモン配合剤(月経困難症治療剤)	ルネスタステロン・エチニルエストラジオール
ロコナル錠	2日間	抗血小板作用薬	トラジビル
ロコナル細粒	2日間	抗血小板作用薬	トラジビル
ロリガ粒状カプセル	7-10日間	抗血小板作用薬	EPA・DHA製剤(イコペンチン誘体)
ワーフアリン錠	5日間	抗凝固薬	ワルファリンカリウム
ワーフアリン顆粒	5日間	抗凝固薬	ワルファリンカリウム
ワルファリン錠/細粒	5日間	抗凝固薬	ワルファリンカリウム

平成29年3月改定

※網掛けは東京慈恵会医科大学附属病院院内採用薬品

一覧の薬剤の処方にご注意いただき、投薬が必要な場合には適切な休薬日を患者さんへご指導ください。休薬期間は検査・手術日を含まない日数のことです。また、記載した薬品名はあくまでも一例ですので成分でご確認ください。なお、削除医薬品についても1年程度は掲載しています。