

申請科	レジメン番号	レジメン名	休業期間 (日)	総コース数	使用薬剤	投与経路	用量	投与時間 間隔	投与日	備考
外科	16-25-020	TS-1+CDDP(80)	35	6コース	シスプラチン S1	点滴静注 内服	60 mg /m2 120 mg /b	1hr 分2	d8 d1-21	80-120mg/b
外科	16-25-023	Bi-weekly Taxotere	14	投与制限なし	ドセタキセル	点滴静注	50 mg /m2	1hr	d1	40-50mg/m2
外科	16-25-026	epi-ADR 動注	28	可能な限り	エビルピシシ	動注	20 mg /m2	1hr	d1,8,15	one shot～持続動注
外科	16-25-027	TS-1+TXT	21	可能な限り	ドセタキセル S1	点滴静注 内服	40 mg /m2 120 mg /b	1hr 分2	d1 d1-14	80-120mg/b
外科	16-25-030	5-FU/MTX	56	可能な限り	フルオロウラシル メトレキサート	点滴静注 点滴静注	600 mg /m2 100 mg /m2	1hr 全開	d1,8,15,22,29,36 d1,8,15,22,29,36	
外科	16-25-031	5FU/LV	56	可能な限り	フルオロウラシル レボホリナート	点滴静注 点滴静注	600 mg /m2 250 mg /m2	全開 2hr	d1,8,15,22,29,36 d1,8,15,22,29,36	
外科	16-25-032	CPT-11単剤	28	可能な限り	イリノテカン	点滴静注	100 mg /m2	90min	d1,8,15,(22)	3～4回投与、2週間休業
外科	16-25-040	TXL+CDDP	28	可能な限り	パクリタキセル シスプラチン	点滴静注 点滴静注	80 mg /m2 20 mg /m2	1hr 1hr	d1,d8,15 d1,d8,15	15-20mg/m2
外科	16-25-043	CPT-11(60)+CDDP(80)	28	可能な限り	イリノテカン シスプラチン	点滴静注 点滴静注	60 mg /m2 60 mg /m2	90min 2hr	d1,8,15 d1	休業期間1～2週
外科	16-25-045	ハーセプチン(高用量)+パクリタキセル併用療法(胃癌)		可能な限り	トラスツズマブ トラスツズマブ パクリタキセル	点滴静注 点滴静注 点滴静注	8 mg /kg 6 mg /kg 80 mg /m2	30-90min 30-90min 1hr	d1 d1 d1,8,15	初回,q3w 2回目以降,q3w q4w
外科	16-25-053	ハーセプチン(高用量)+TS-1+CDDP併用療法		可能な限り	トラスツズマブ トラスツズマブ シスプラチン S1	点滴静注 点滴静注 点滴静注 内服	8 mg /kg 6 mg /kg 60 mg /m2 80 mg /b	30-90min 30-90min 2hr 分2	d1 d1 d8 d1-21	初回,q3w 2回目以降,q3w q5w q5w
外科	16-25-056	TS-1+パクリタキセル	21	続けられるまで	パクリタキセル S1	点滴静注 内服	80 mg /m2 120 mg /b	2hr 分2	d1,8 d1-14	50-120mg/b
外科	16-25-057	CDDP+CPT-11	28	続けられるまで	シスプラチン イリノテカン	点滴静注 点滴静注	30 mg /m2 60 mg /m2	1hr 90min	d1,15 d1,15	
外科	16-25-058	ハーセプチン+TS-1	21	可能なかぎり	トラスツズマブ トラスツズマブ S1	点滴静注 点滴静注 内服	8 mg /kg 6 mg /kg 120 mg /b	90min 30-90min 分2	d1 d1 d1-14	初回 2回目以降 60-120mg/b
外科	16-25-060	カペシタピン+CDDP	21	中止基準に該当しない限り	シスプラチン カペシタピン	点滴静注 内服	80 mg /m2 2000 mg /m2	2hr 分2	d1 d1-14	
外科	16-25-061	ハーセプチン+カペシタピン+CDDP	21	中止基準に該当しない限り	シスプラチン トラスツズマブ トラスツズマブ カペシタピン	点滴静注 点滴静注 点滴静注 内服	80 mg /m2 8 mg /kg 6 mg /kg 2000 mg /m2	2hr 30-90min 30-90min 分2	d1 d1 d1 d1-14	初回 2回目以降
外科	16-25-066	TS-1+PTX+NAM	21		パクリタキセル パクリタキセル 腹腔内注入 腹腔内注入 S1	点滴静注 腹腔内注入 腹腔内注入 内服	50 mg /m2 20 mg /m2 80 mg /b 80 mg /b	1hr 1hr 1hr 分2	d1,8 d1,8 d1,8 d1-14	40-80mg/b
外科	16-25-067	TS-1+オキサリプラチン併用療法	21		オキサリプラチン S1	点滴静注 内服	130 mg /m2 120 mg /b	2hr 分2	d1 d1(夕)-d15(朝)	75-130mg/m2 80-120mg/b
外科	16-25-068	ラムシルマブ+パクリタキセル	28	PDに至るまで	ラムシルマブ パクリタキセル	点滴静注 点滴静注	8 mg /kg 80 mg /m2	※ 1hr	d1,15 d1,8,15	①60min②30min
外科	16-25-069	XELOX療法(胃癌)	21	8コース	オキサリプラチン カペシタピン	点滴静注 内服	130 mg /m2 2000 mg /b	2hr 分2	d1 d1-14	
外科	16-25-070	ラムシルマブ単剤	14	PDまで	ラムシルマブ	点滴静注	8 mg /kg	※	d1	①60min②30min
外科	16-25-072	Weekly-nab-PTX	28	PDとなるまで	ナブパクリタキセル	点滴静注	100 mg /m2	30min	d1,8,15	
外科	16-25-074	Tmab+SOX	21		オキサリプラチン トラスツズマブ トラスツズマブ S1	点滴静注 点滴静注 点滴静注 内服	130 mg /m2 8 mg /kg 6 mg /kg 80 mg /b	2hr 90min 30-90min 分2	d1 d1(初回) d1(2回目以降) d1-14	100又は130mg/m2
外科	16-25-076	mFOLFOX6(胃癌・インフューザーポンプ)	14	PDまで	オキサリプラチン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル	点滴静注 点滴静注 点滴静注 CV	85 mg /m2 200 mg /m2 400 mg /m2 2400 mg /m2	2hr 2hr 全開 46hr	d1 d1 d1 d1	インフューザーポンプ
外科	16-25-077	nab-PTX+RAM	28	PDになるまで	ラムシルマブ ナブパクリタキセル	点滴静注 点滴静注	8 mg /kg 100 mg /m2	※ 30min	d1,15 d1,8,15	①60min②30min
外科	16-25-078	ニボルマブ療法	14		ニボルマブ	点滴静注	240 mg /b	30min	d1	
外科	16-25-079	ペムブロリズマブ	21	制限無し	ペムブロリズマブ	点滴静注	200 mg /b	30min	d1	
外科	16-25-080	エンハーツ	21	可能な限り	トラスツズマブ デルクステカン	点滴静注	6.4 mg /kg	90min②90分 以降30min③	d1	
外科	16-25-081	FTD・TPi+Ram	28	PDまで	ラムシルマブ	点滴静注	8 mg /kg	※	d1,15	①60min②30min

申請科	レジメン番号	レジメン名	休業期間 (日)	総コース数	使用薬剤	投与経路	用量	投与時間 間隔	投与日	備考
					トリフルリジン・チビラシル	内服	70 mg /m2	分2	d1-5,d8-12	
外科	16-25-082	Nivolumab(q4w)	28	規定なし	ニボルマブ	点滴静注	480 mg /b	30min	d1	
外科	16-25-083	CPT-11+Ram	14	PDまで	イリノテカン ラムシルマブ	点滴静注 点滴静注	150 mg /m2 8 mg /kg	90min ※	d1 d1+W318	①60min②30min
外科	16-25-084	CPT-11(q2w)	14	PDまで	イリノテカン	点滴静注	150 mg /m2	90min	d1	
外科	16-25-085	CapeOX+Nivo	21	なし	ニボルマブ オキサリプラチン カペシタビン	点滴静注 点滴静注 内服	360 mg /b 130 mg /m2 2000 mg /b	30min 2hr 分2	d1 d1 d1(タ)-15(朝)	
外科	16-25-086	G-SOX(L-OHP:100mg/㎡)+Nivo	21	規定なし(病勢の悪化まで投与可)	オキサリプラチン ニボルマブ S1	点滴静注 点滴静注 内服	100 mg /m2 360 mg /m2 80 mg /m2	2hr 30min 分2	d1 d1 d1(タ)-d15(朝)	
外科	16-25-088	mFOLFOX6+Nivo[インフューザーポンプ]	14	規定なし	オキサリプラチン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル ニボルマブ	点滴静注 点滴静注 点滴静注 CV 点滴静注	85 mg /m2 200 mg /m2 400 mg /m2 2400 mg /m2 240 mg /b	2hr 2hr 全開 46hr 30min	d1 d1 d1 d1 d1	インフューザーポンプ
外科	16-25-089	SOX(L-OHP:130mg/㎡)+Nivo	21	規定なし(病勢の悪化まで投与可)	オキサリプラチン ニボルマブ S1	点滴静注 点滴静注 点滴静注 内服	130 mg /m2 360 mg /m2 80 mg /m2	2hr 30min 分2	d1 d1 d1(タ)-d15(朝)	
外科	16-25-090	CapeOX+Zolbetuximab(初回)	21	PDまで	ゾルベツキシマブ オキサリプラチン カペシタビン	点滴静注 点滴静注 内服	800 mg /b 130 mg /m2 2000 mg /b	※ 2hr 分2	d1 d1 d1(タ)-15(朝)	50mL/hrから開始し、30分ごとに30mL/hrずつ速度を上げ、最高速度は200mL/hrまで
外科	16-25-091	CapeOX+Zolbetuximab(2回目以降)	21	PDまで	ゾルベツキシマブ オキサリプラチン カペシタビン	点滴静注 点滴静注 内服	600 mg /b 130 mg /m2 2000 mg /b	※ 2hr 分2	d1 d1 d1(タ)-15(朝)	50mL/hrから開始し、30分ごとに30mL/hrずつ速度を上げ、最高速度は200mL/hrまで
外科	16-25-094	mFOLFOX6+Zolbetuximab(初回)[インフューザーポンプ]	14	PDまで	ゾルベツキシマブ オキサリプラチン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注 CV	800 mg /b 85 mg /m2 200 mg /m2 400 mg /m2 2400 mg /m2	※ 2hr 2hr 全開 46hr	d1 d1 d1 d1 d1	インフューザーポンプ
外科	16-25-095	mFOLFOX6+Zolbetuximab(2回目以降)[インフューザーポンプ]	14	PDまで	ゾルベツキシマブ	点滴静注	400 mg /b	※	d1	50mL/hrから開始し、30分ごとに30mL/hrずつ速度を上げ、最高速度は200mL/hrまで

申請科	レジメン番号	レジメン名	休業期間 (日)	総コース数	使用薬剤	投与経路	用量	投与時間 間隔	投与日	備考
					オキサリプラチン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル	点滴静注 点滴静注 点滴静注 CV	85 mg /m2 200 mg /m2 400 mg /m2 2400 mg /m2	2hr 2hr 全開 46hr	d1 d1 d1 d1	インフューザーポンプ
外科	16-25-096	CapeOX+Pem	21	35コース(オキサリプラチン投与は6コースまで許容)	ペムブロリズマブ オキサリプラチン カベシタピン	点滴静注 点滴静注 内服	200 mg /b 130 mg /m2 2000 mg /b	30min 2hr 分2	d1 d1 d1(タ)-15(朝)	
外科	16-25-097	SP(q3w)+Pem	21	35コース(オキサリプラチン投与は6コースまで許容)	ペムブロリズマブ シスプラチン S-1	点滴静注 点滴静注 内服	200 mg /b 60 mg /m2 80 mg /m2	30min 2hr 分2	d1 d1 d1(タ)-15(朝)	
外科	16-25-098	SOX(L-OHP:130mg/m ²)+Pem	21	35コース(オキサリプラチン投与は6コースまで許容)	ペムブロリズマブ オキサリプラチン S-1	点滴静注 点滴静注 内服	200 mg /b 130 mg /m2 80 mg /m2	30min 2hr 分2	d1 d1 d1(タ)-d15(朝)	
外科	16-25-101	CapeOX+Tmab+Pembrolizumab(q3w)	21	35コース	ペムブロリズマブ トラスツズマブ トラスツズマブ オキサリプラチン カベシタピン	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注 内服	200 mg /b 8 mg /kg 6 mg /kg 130 mg /m2 2000 mg /b	30min 90min 30-90min 2hr 分2	d1 d1(初回) d1(2回目以降) d1 d1(タ)-15(朝)	
外科	16-25-102	CapeOX+Tmab+Pembrolizumab(q6w)	42	17コース	ペムブロリズマブ トラスツズマブ トラスツズマブ オキサリプラチン カベシタピン	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注 内服	400 mg /b 8 mg /kg 6 mg /kg 130 mg /m2 2000 mg /b	30min 90min 30-90min 2hr 分2	d1 d1(初回) d22(初回)/d1.22(2回目以降) d1.22 d1(タ)-15(朝)/d22(タ)-36(朝)	
外科	16-25-105	SOX+Tmab+Pembrolizumab(q3w)	21	35コース	ペムブロリズマブ トラスツズマブ トラスツズマブ オキサリプラチン S-1	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注 内服	200 mg /b 8 mg /kg 6 mg /kg 130 mg /m2 80-120 mg /b	30min 90min 30-90min 2hr 分2	d1 d1(初回) d1(2回目以降) d1 d1(タ)-15(朝)	
外科	16-25-106	SOX+Tmab+Pembrolizumab(q6w)	42	17コース	ペムブロリズマブ トラスツズマブ トラスツズマブ オキサリプラチン S-1	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注 内服	400 mg /b 8 mg /kg 6 mg /kg 130 mg /m2 80-120 mg /b	30min 90min 30-90min 2hr 分2	d1 d1(初回) d22(初回)/d1.22(2回目以降) d1.22 d1(タ)-15(朝)/d22(タ)-36(朝)	
外科	16-25-107	CapeOX+Pem(q6w)	42	17コース	ペムブロリズマブ オキサリプラチン カベシタピン オキサリプラチン S-1	点滴静注 点滴静注 内服 点滴静注 内服	400 mg /b 130 mg /m2 2000 mg /b 130 mg /m2 80-120 mg /b	30min 2hr 分2 2hr 分2	d1 d1.22 d1(タ)-15(朝)/d22(タ)-36(朝) d1.22 d1-14/d22-35	
外科	16-25-109	SOX(L-OHP:130mg/m ²)Pem(q6w)	42	17コース	ペムブロリズマブ	点滴静注	400 mg /b	30min	d1	