

申請科	レジメン番号	レジメン名	休業期間 (日)	総コース数	使用薬剤	投与経路	用量	投与時間 間隔	投与日	備考
産婦人科	22-00-013	NED/CPT11	28	5から6コース	イリノテカン ネダブラチン	点滴静注 点滴静注	50 mg /m2 80 mg /m2	1hr 2hr	d1,8,15 d1	
産婦人科	22-00-026	MTX(筋注)	7	1から2コース	メトレキサート	筋注	50 mg /m2		d1	
産婦人科	22-00-049	ドキシル単剤療法	28	DXRの総投与量が500mg/m2まで	リボソーマルドキシルビシン	点滴静注	40 mg /m2	2hr	d1	ドキシルビシン500mg/m2まで
産婦人科	22-00-050	ドキシル+カルボプラチン併用療法	28	DXRの総投与量が500mg/m2まで	リボソーマルドキシルビシン カルボプラチン	点滴静注 点滴静注	30 mg /m2 5 (AUC)	1hr 1hr	d1 d1	ドキシルビシン500mg/m2まで
産婦人科	22-00-067	ジェムザール単剤療法	28	6コース	ゲムシタビン	点滴静注	1000 mg /m2	30min	d1,8,15	可能な限り継続
産婦人科	22-00-068	ドセタキセル+ジェムザール併用療法	21	6コース	ドセタキセル ゲムシタビン	点滴静注 点滴静注	70 mg /m2 800 mg /m2	1hr 30min	d1 d1,8	
産婦人科	22-00-072	パクリタキセル+パラプラチン併用療法	21	6から12コース	パクリタキセル カルボプラチン	点滴静注 点滴静注	180 mg /m2 6 (AUC)	3hr 1hr	d1 d1	
産婦人科	22-00-073	パクリタキセル+パラプラチン併用療法(パクリタキセル週1回投与)	21	6から12コース	パクリタキセル カルボプラチン	点滴静注 点滴静注	80 mg /m2 6 (AUC)	1hr 1hr	d1,8,15 d1	
産婦人科	22-00-074	パクリタキセル+パラプラチン併用療法(3分割)	21	6から12コース	パクリタキセル カルボプラチン	点滴静注 点滴静注	60 mg /m2 2 (AUC)	1hr 1hr	d1,8,15 d1,8,15	
産婦人科	22-00-075	パクリタキセルconsoli療法	28	12コース	パクリタキセル	点滴静注	180 mg /m2	3hr	d1	
産婦人科	22-00-093	ブリプラチン+放射線併用療法	7	6コース	シスプラチン	点滴静注	40 mg /m2	2hr	d1	
産婦人科	22-00-097	ドセタキセル(70)+パラプラチン併用療法	21	6コース	ドセタキセル カルボプラチン	点滴静注 点滴静注	70 mg /m2 6 (AUC)	1hr 1hr	d1 d1	
産婦人科	22-00-104	ノギテカン(ハイカムチン)	21	6コース	ハイカムチン	点滴静注	1.5 mg /m2	30min	d1-5	
産婦人科	22-00-107	カンプト単剤療法	28	6コース	イリノテカン	点滴静注	150 mg /m2	90min	d1,d15	
産婦人科	22-00-110	MTX療法(絨毛)	14	hCGの結果に応じて	メトレキサート	筋注	20 mg /b		d1-5	点滴(30min)も可
産婦人科	22-00-111	ドセタキセル単剤	21		ドセタキセル	点滴静注	70 mg /m2	1hr	d1	
産婦人科	22-00-113	TC(dosedenseTC)+アバステン	21	6コース(Bevは規定なし)	パクリタキセル カルボプラチン ペバシズマブ	点滴静注 点滴静注 点滴静注	80 mg /m2 6 (AUC) 15 mg /kg	1hr 1hr ※	d1,d8,d15 d1 d1	※①90min②60min③30min
産婦人科	22-00-114	TC(tri-weekly)+アバステン	21	6コース(Bevは規定なし)	パクリタキセル カルボプラチン ペバシズマブ	点滴静注 点滴静注 点滴静注	180 mg /m2 6 (AUC) 15 mg /kg	3hr 1hr ※	d1 d1 d1	※①90min②60min③30min
産婦人科	22-00-121	DC+アバステン	21	6コース(Bevは規定なし)	ドセタキセル カルボプラチン ペバシズマブ	点滴静注 点滴静注 点滴静注	70 mg /m2 6 (AUC) 15 mg /kg	1hr 1hr ※	d1 d1 d1	※①90min②60min③30min
産婦人科	22-00-133	Act-D単独	14	hCGが陰性化するまで	アクチノマイシンD	点滴静注	0.01 mg /kg	30min	d1-5	
産婦人科	22-00-134	TC+Bev(頸癌)	21	6コース(最大9コース,Bevは規定なし)	パクリタキセル カルボプラチン ペバシズマブ	点滴静注 点滴静注 点滴静注	175 mg /m2 5 (AUC) 15 mg /kg	3hr 1hr ※	d1 d1 d1	※①90min②60min③30min
産婦人科	22-00-144	Eribulin(ハラヴェン)	21	PDまで	エリブリン	点滴静注	1.4 mg /m2	全開	d1,d8	
産婦人科	22-00-147	ドキソルビシン単剤療法	21	6コース	ドキソルビシン	点滴静注	75 mg /m2	30min	d1	
産婦人科	22-00-149	GEM+Bev(3週)	21	PDまで	ゲムシタビン ペバシズマブ	点滴静注 点滴静注	1000 mg /m2 15 mg /kg	30min ※	d1,d8 d1	※①90min②60min③30min
産婦人科	22-00-150	ドキシル+アバステン療法(Bev2週毎投与)	28	6コース(Bevは規定なし)	リボソーマルドキシルビシン ペバシズマブ	点滴静注 点滴静注	40 mg /m2 10 mg /kg	2hr ※	d1 d1,d15	※①90min②60min③30min
産婦人科	22-00-153	Etoposide+CDDP療法(EP療法)	21	5コース	エトポシド シスプラチン	点滴静注 点滴静注	100 mg /m2 60 mg /m2	90min 2hr	d1-3 d1	
産婦人科	22-00-154	TC療法(頸癌)	21	6コース	パクリタキセル カルボプラチン	点滴静注 点滴静注	175 mg /m2 5 (AUC)	3hr 1hr	d1 d1	
産婦人科	22-00-163	TP療法(卵巣癌)	21	6コース	パクリタキセル シスプラチン	点滴静注 点滴静注	180 mg /m2 75 mg /m2	3hr 2hr	d1 d1	
産婦人科	22-00-170	ペムブロリズマブ	21		ペムブロリズマブ	点滴静注	200 mg /b	30min	d1	
産婦人科	22-00-176	ペムブロリズマブ(6週間間隔)	42		ペムブロリズマブ	点滴静注	400 mg /b	30min	d1	
産婦人科	22-00-177	Bev+Olaparib(維持)	21	Bev:最長15ヶ月間、olapa:24ヶ月まで	ペバシズマブ オラパリブ	点滴静注 内服	15 mg /kg 600 mg /b	※ 分2	d1 d1-21	※①90min②60min③30min
産婦人科	22-00-178	CBDC/GEM	21	6コース(MAX10コース)	カルボプラチン ゲムシタビン	点滴静注 点滴静注	4 (AUC) 1000 mg /m2	1hr 30min	d1 d1,d8	
産婦人科	22-00-179	CBDC/GEM+Bev	21	6コース(MAX10コース、Bevは規定なし)	カルボプラチン ゲムシタビン ペバシズマブ	点滴静注 点滴静注 点滴静注	4 (AUC) 1000 mg /m2 15 mg /kg	1hr 30min ※	d1 d1,d8 d1	※①90min②60min③30min
産婦人科	22-00-180	GCRT[SH法]	7	5から6コース	シスプラチン	点滴静注	40 mg /m2	2hr	d1	

申請科	レジメン番号	レジメン名	休業期間 (日)	総コース数	使用薬剤	投与経路	用量	投与時間 間隔	投与日	備考
産婦人科	22-00-182	CBDC/PLD+Bev	28	6コース	カルボプラチン	点滴静注	5 (AUC)	1hr	d1	1-6コース:※①90min②60min③30min 7コース目以降(q3w):※①90min②60min③30min
			21		リボソーマルドキソルピジン	点滴静注	30 mg /m2	90min	d1	
					ペバシズマブ	点滴静注	10 mg /kg	※	d1,d15	
産婦人科	22-00-183	NDP/PTX	28	5から6コース	ペバシズマブ	点滴静注	15 mg /kg	※	d1	
産婦人科	22-00-185	Lenvatinib+Pem(q3w)	21		ネダブラチン	点滴静注	80 mg /m2	1hr	d1	
					パクリタキセル	点滴静注	175 mg /m2	3hr	d1	
産婦人科	22-00-186	Lenvatinib+Pem(q6w)	42		ペムブロリズマブ	点滴静注	200 mg /b	30min	d1	
					レンパチニブ	内服	20 mg /b	分1	d1-21	
産婦人科	22-00-190	Pembrolizumab(TMB-High,q3w)	21		ペムブロリズマブ	点滴静注	400 mg /b	30min	d1	
産婦人科	22-00-191	Pembrolizumab(TMB-High,q6w)	42		レ	内服	20 mg /b	分1	d1-42	
産婦人科	22-00-194	TC+Pem	21	6コース(Pembroは35コース)	ペムブロリズマブ	点滴静注	200 mg /b	30min	d1	
					パクリタキセル	点滴静注	175 mg /m2	3hr	d1	
					カルボプラチン	点滴静注	5 (AUC)	1hr	d1	
					ペムブロリズマブ	点滴静注	200 mg /b	30min	d1	
産婦人科	22-00-195	TC+Bev+Pem	21	6コース(Bevは規定なし、Pembroは35コース)	パクリタキセル	点滴静注	175 mg /m2	3hr	d1	※①90min②60min③30min
					カルボプラチン	点滴静注	5 (AUC)	1hr	d1	
					ペバシズマブ	点滴静注	15 mg /kg	※	d1	
					ペムブロリズマブ	点滴静注	200 mg /b	30min	d1	
産婦人科	22-00-196	Cemiplimab	21	上限なし	セミプリマブ	点滴静注	350 mg /b	30min	d1	
産婦人科	20-00-200	TC+Durva	21	原則4～6コース その後維持療法へ	デュルバルマブ	点滴静注	1120 mg /b	1hr	d1	
					パクリタキセル	点滴静注	175 mg /m2	3hr	d1	
					カルボプラチン	点滴静注	5 (AUC)	1hr	d1	
産婦人科	22-00-201	Durvalumab維持療法	28	病勢進行や予期せぬ毒性の発現まで継続	デュルバルマブ	点滴静注	1500 mg /b	1hr	d1	
産婦人科	22-00-202	Durvalumab+Olaparib維持療法	28	病勢進行や予期せぬ毒性の発現まで継続	デュルバルマブ	点滴静注	1500 mg /b	1hr	d1	
					オラパリブ	内服	600 mg /b	分2	連日(d1-28)	
産婦人科	22-00-206	GCRT (CDDP+Pem SH)	42	シスプラチンq1wで5回ペムブロリズマブ計20回(1～5回まではq3w、6回目以降q6wで15回)	シスプラチン	点滴静注	40 mg /m2	2hr	d1,8,15,22,29	
					ペムブロリズマブ	点滴静注	200 mg /b	30min	d1,22	
産婦人科	22-00-207	TC+Pem	21	パクリタキセル、カルボプラチン、ペムブロリズマブ、ペバシズマブ及び抗がん剤の併用療法は規定通り、ペムブロリズマブ、ペバシズマブ、CBDC/PLDによる療法	ペムブロリズマブ	点滴静注	200 mg /b	30min	d1	
					パクリタキセル	点滴静注	175 mg /m2	3hr	d1	
					カルボプラチン	点滴静注	5 (AUC)	1hr	d1	
産婦人科	22-00-212	GCRT (CDDP+Pem)	42	シスプラチンq1wで5回ペムブロリズマブ計20回(1～5回まではq3w、6回目以降q6wで15回)	シスプラチン	点滴静注	40 mg /m2	2hr	d1,8,15,22,29	
					ペムブロリズマブ	点滴静注	200 mg /b	30min	d1,22	
産婦人科	22-00-213	Tisotumab vedotin(TV)	21	PDまで	チソツマブ ベドチン	点滴静注	2 mg /kg	30min	d1	