

クリニカルパスウェイ
突発性難聴の治療を受ける患者さんへ

2016年4月作成
東京慈恵会医科大学附属第三病院

患者番号 @PATIENTID 患者氏名 @PATIENTNAME

	外来	入院1日～2日目	入院3日～5日目	入院6日～7日目	入院8日～10日目	退院日
日時	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
目標	<input type="checkbox"/> 安静にして、症状悪化を防ぎましょう	<input type="checkbox"/> 点滴治療を受け、ゆっくり休息をとりましょう	<input type="checkbox"/> 点滴治療を受け、ゆっくり休息をとりましょう	<input type="checkbox"/> 点滴治療を受け、ゆっくり休息をとりましょう	<input type="checkbox"/> 点滴治療を受け、ゆっくり休息をとりましょう	<input type="checkbox"/> 診察後、午前中に退院します
食事	<input type="checkbox"/> 制限はありません 	<input type="checkbox"/> 制限はありません <input type="checkbox"/> 必要時制限食となります				
活動	<input type="checkbox"/> 制限はありません <input type="checkbox"/> めまいやふらつき等がある場合は、転倒の危険があるため、無理に1人で動いたりせず看護師にお知らせください	<input type="checkbox"/> 制限はありません <input type="checkbox"/> めまいやふらつき等がある場合は、転倒の危険があるため、無理に1人で動いたりせず看護師にお知らせください	<input type="checkbox"/> 制限はありません <input type="checkbox"/> めまいやふらつき等がある場合は、転倒の危険があるため、無理に1人で動いたりせず看護師にお知らせください	<input type="checkbox"/> 制限はありません	<input type="checkbox"/> 制限はありません	<input type="checkbox"/> 退院後の外来予約票をお受け取りください
検査処置	<input type="checkbox"/> 場合により採血・レントゲン等があります <input type="checkbox"/> 聴力検査があります	<input type="checkbox"/> 4階の耳鼻処置室で診察します <input type="checkbox"/> 血糖値を1日3回測定する場合があります <input type="checkbox"/> 入院中にMRIを撮ることがあります	<input type="checkbox"/> 4階の耳鼻処置室で診察します <input type="checkbox"/> 血糖値を1日3回測定する場合があります <input type="checkbox"/> 聴力機能検査をします	<input type="checkbox"/> 4階の耳鼻処置室で診察します <input type="checkbox"/> 血糖値を1日3回測定する場合があります <input type="checkbox"/> 経過によって点滴治療を2クール行うことがあります	<input type="checkbox"/> 4階の耳鼻処置室で診察します <input type="checkbox"/> 血糖値を1日3回測定する場合があります <input type="checkbox"/> 聴力機能検査をします	<input type="checkbox"/> 4階の耳鼻処置室で診察します 
薬	<input type="checkbox"/> 常用薬は、医師の指示に従い内服してください 	<input type="checkbox"/> 常用薬は、医師の指示に従い内服してください <input type="checkbox"/> 入院後、薬の内容を確認しますので、ご持参ください <input type="checkbox"/> 薬剤師から薬の説明があります <input type="checkbox"/> ステロイドホルモンを点滴します <input type="checkbox"/> 症状改善を目的としてビタミン剤、循環改善薬、副作用対策として胃薬を内服します	<p>〈点滴治療とは〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ソル・コテフというステロイドホルモンを点滴で使用します ・ソル・コテフを500mg～400mg～300mg～200mg～100mgというように5日間かけて点滴します これを1クールといいます ・症状により2クール行う場合があります 			
清潔		<input type="checkbox"/> シャワー浴は可能です				
指導説明	<input type="checkbox"/> 入院持参物品 <input type="checkbox"/> 常用薬(7日分) <input type="checkbox"/> この説明書 <input type="checkbox"/> 日常生活物品	<input type="checkbox"/> ゆっくり休むことが回復には必要です <input type="checkbox"/> 眠れない場合は入眠剤をお渡します <input type="checkbox"/> 入院中は、感染予防のため手洗い・うがい・マスクの着用をお願いします	<input type="checkbox"/> 点滴の副作用として胃部不快感・むくみ・体重増加・吐気・発疹・血圧上昇(動悸・頭痛)などがあります <input type="checkbox"/> 症状がある時は看護師にお知らせください		<input type="checkbox"/> 退院後の生活について <ul style="list-style-type: none"> ・ゆっくりと過ごせる環境を整えましょう ・退院処方がある場合は、指示通りに内服してください ・回復には個人差がありますので、外来にて経過を診ていきます ・退院後も胃部不快感、むくみ、発疹などの症状が続く場合があります ・退院後も症状が長く続く場合は、電話連絡の上、受診してください ・退院後も手洗い・うがい・マスクの着用を継続し、感染対策予防に努めましょう 	